

2. *Icaria Cohni*, n. sp. — Corps de petite taille, assez robuste, noir avec les mandibules, le clypéus, le devant du scape, une grande tache entre les antennes, la plus grande partie des orbites des yeux, le dessous des cuisses et des hanches, la plus grande partie du pronotum, l'écusson, le post-écusson, les écailles, le devant du mesosternum, une tache sur les mésopleures, deux grandes taches sur le bas du segment médiaire, le bord apical du pétiole abdominal, une tache de chaque côté à la base et une large marge apicale, régulière, sur le 2^e tergite, blanc jaunâtre; les antennes, une grande partie des pattes, les angles postérieurs du pronotum, la base des taches mésopleurales, le pétiole abdominal et l'extrémité de l'abdomen, roux-ferrugineux. Antennes normales, sans aspérités et le dernier article simplement conique; clypéus plus large que long; thorax court, large, à ponctuation grosse, aciculée, serrée; ailes hyalines, à teinte grise, l'extrémité un peu plus sombre, la cellule radiale noircie; abdomen avec le pétiole comme chez *I. picta* Saussure, mais un peu plus court, le 2^e tergite court, ovale, la ponctuation effacée, le bord apical avec une étroite marge déprimée. — ♂ Long. : 7 mill.

Ille Bougainville; novembre 1908 (D^r L. COHN).

Cette espèce est dédiée à M. le D^r L. COHN qui l'a découverte. Elle rappelle beaucoup *I. variegata* Sm. par sa petite taille et sa coloration, mais elle s'en distingue de suite par la forme du pétiole abdominal et des antennes. Elle est voisine également de *I. picta* Sauss. dont elle se distingue facilement par la conformation des antennes et du 1^{er} tergite abdominal et par la brièveté du thorax.

Odyneropsis Schrottky,

genre d'Abeilles parasites mimétiques [HYM].

par A. DUCKE

La première espèce connue de ce genre a été décrite par FRIESE en 1900, comme *Rhathymus armatus*. En 1902, SCHROTTKY a établi le genre *Odyneropsis*, mais il l'a placé dans le voisinage de *Coelioxys*. Plus tard, ayant découvert encore deux espèces, j'ai pu démontrer (*Rev. d'Ent.* [1908], p. 41) que les *Odyneropsis* n'ont avec *Rhathymus* qu'une ressemblance superficielle, différant surtout par le scutellum longuement denté de chaque côté, le 3^e segment dorsal des ♀ muni d'un trou très distinct, entouré d'une carène, au milieu de sa partie basale, le bord

apical de ce segment largement et profondément échancré en forme de triangle, le 6^e segment ventral des ♀ réduit à deux appendices qui ne sont pas toujours bien visibles, le 7^e segment dorsal des ♂ avec l'aréa pygidiale très distincte, carrée avec les angles postérieurs arrondis. — *Odyneropsis* a en réalité beaucoup plus de parenté avec les *Epcolus* qu'avec les *Rhathymus*. Les ♀ ont aussi plusieurs caractères en commun avec *Thalestria*, mais les ♂ en diffèrent longuement.

Voici les espèces d'*Odyneropsis* connues jusque maintenant :

1. *O. holosericea* Schrottky, *Revista do Museu Paulista* V [1902], p. 433, tab. XII, f. 44, ♂♀.

? *Rhathymus armatus* Friese, *Entomolog. Nachr.* XXVI, [1900], p. 65 ♂.

O. armata Ducke, *Rev. d'Ent.* [1908], p. 41, ♀♂.

Saô Paulo, Brésil méridional, Musées de Saô Paulo et de Pará, et Collection FRIESE. — Cette espèce rappelle, par ses couleurs, surtout la *Montezumia brunnea* Sauss.

2. *O. apicalis*, n. sp. — ♀ ♂. Corps entièrement noir, mat, le duvet du vertex et du dos du thorax à reflets grisâtres. Tubercules du scutellum plus forts que dans *holosericea*, dents plus courtes. Abdomen plus court que dans les deux espèces amazoniennes, plus large à sa base et plus convexe que dans *holosericea*; 1^{er} segment abdominal largement sessile comme dans les *Monobia*; 6^e segment dorsal de la ♀ relativement court. Ailes noires, le dernier tiers des ailes antérieures blanc; 3^e cellule cubitale un petit peu moins haute que dans *holosericea*. — Longueur totale : 15-16 millim.

Cordova et Orizaba (Mexique), 1 ♀ et 3 ♂ au Muséum de Paris; d'autres exemplaires provenant des mêmes localités se trouvent dans les Musées de Pará, Genève, Vienne et Berlin. Le ♂ qui existe dans ce dernier Musée à l'extrémité de l'aile seulement un peu décolorée.

Cette espèce imite parfaitement la guêpe sociale *Parachartergus apicalis* F., la guêpe solitaire *Monobia apicalipennis* Sauss. et d'autres Hyménoptères néotropicaux encore.

3. *O. vespiformis* Ducke.

Rhathymus vespiformis Ducke, *Zeitschr. Hymen. Dipter.* VII [1907], p. 437, ♂.

O. vespiformis Ducke, *Rev. d'Ent.* [1908], p. 41, ♂.

Belem de Pará (Mus. de Pará); Cayenne (Mus. de Berlin). Imite le *Polistes analis* F. et plusieurs autres Vespides.

4. *O. foveata* Ducke.

Rhathymus foveatus Ducke, *Zeitschr. Hymen. Dipter.* VII [1907], p. 438, ♀.

O. foveata Ducke, *Rev. d'Ent.* [1908], p. 41, ♀.

Tellé (Haut Amazone). Imite le *Polistes melanosoma* Sauss., et autres guêpes.

5. *O. armata* Friese.

Rhathymus armatus Friese, *Entom. Nachr.* XXVI, [1900], p. 65, ♂. — « ♂. *Fuscus, brevissime flavido-velutinus, clypeo fere plano, labro apice bidentato, scutello bigibboso, lobis laterilibus dente prolongato; abdomine fulvo-velutino, segmento anali (7°) parallelo; pedibus rufis.* — Long. : 15 mill. — Tucuman (Mus. de Halle) ».

Cette description ne permet pas d'identifier l'espèce de FRIESE avec l'*O. holosericea* Schrottky, comme a fait FRIESE (*Zeitschr. Hymen. Dipter.* IV, [1904], p. 100). L'*O. armata* a, selon la description, les couleurs assez différentes de celles de l'*O. holosericea*, et il faudrait l'inspection simultanée des deux formes, pour les pouvoir éventuellement réunir.

Les 4 espèces jusqu'ici suffisamment connues se distinguent de la manière suivante :

1. Ailes jaunâtres; 3^e cellule cubitale un peu plus large que haute. Abdomen allongé. Tubercules centraux du scutellum saillants. 2.
- Ailes en partie noirâtres; 3^e cellule cubitale au moins aussi haute que large. Abdomen plus court, dans la ♀ comprimé vers l'apex, son 5^e segment très convexe. 3.
2. Abdomen de la ♀ (seule connue) moins comprimé vers l'apex que dans l'*armata*; 6^e segment dorsal moins convexe. Corps mat, brun unicolore, à peine avec quelques parties plus noirâtres, d'autres parties plus roussâtres. — 48 1/2 mill. *foveata* Ducke.
- Corps du ♂ (seul connu) jaune testacé, mat, la moitié apicale de l'abdomen noirâtre et luisante. — 16 1/2 mill. *respiformis* Ducke.
3. Tubercules centraux du scutellum plus faibles. Corps noir ou brun noirâtre, mat, le thorax (excepté le pronotum et la partie antérieure du mésonotum), la base du 1^{er} segment abdominal et les pattes ferrugineux. Ailes presque hyalines, mais avec une large bande noirâtre au

long de la côte antérieure. — 15-16 mill.....

..... *holosericea* Schrottky.

- Tubercules centraux du scutellum plus saillants. Base de l'abdomen plus large que dans toutes les autres espèces. Corps entièrement noir, mat; ailes noirâtres, les antérieures blanches dans leur dernier tiers. — 15-16 mill..... *apicalis* Ducke.

Une nouvelle Fourmi [HYM.] de Cuba

par le D^r F. SANTSCHI.

Pseudomyrma Pazosi, n. sp. — ♂ Long. : 3-4 mill. Jaune ambré, abdomen noir. Dents et denticules des mandibules brun noirâtre. (Parfois chez les petits exemplaires une étroite bande brunâtre sur le 2^e article du pédicule.) Lisse avec une fine ponctuation très espacée sur la tête, plus dense en avant des yeux et le dessus du thorax microscopiquement réticulé, surtout en arrière. Mandibules faiblement striées, luisantes. Abdomen très luisant. Quelques rares poils dressés sur la tête, pubescence fine et courte sur les antennes et les pattes, absentes ailleurs. Tête moyennement allongée, à peine un peu plus large en avant, à côtés parallèles à peine convexes. Bord occipital droit. Yeux grands comme la moitié des côtés de la tête et situés très en avant comme chez *flavidula* Sm. Trois ocelles distincts. Épistome prolongé en lobe tronqué caréné, limité de chaque côté par une échancrure angulaire. Arêtes frontales parallèles à peine plus rapprochées en arrière. Le scape n'atteint pas le milieu de la longueur de la tête. Mandibules armées de deux dents apicales assez fortes suivies de 3 à 4 denticules indistincts. Thorax légèrement aplati, faiblement arqué d'avant en arrière et peu impressionné entre ses segments. Pronotum à peine plus long que large, plus large en avant, où il est subbordé ainsi que sur les 2/3 antérieurs. Mésonotum comme chez *flavidula* Sm. sur le même plan que l'épinotum. Celui-ci a sa face basale d'un tiers plus longue que la face déclive : 1^{er} nœud du pédicule comme chez *flavidula*, mais un peu plus arrondi transversalement, légèrement plus élevé et plus large en arrière ; 2^e nœud un peu plus court et plus globuleux. Abdomen très étroit.

♀ Long. : 5 mill. Insertions alaires brunâtres, tête beaucoup plus longue que l'ouvrière, le reste semblable.

San Antonio de los Baños, Cuba (D^r PAZOS).